

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
30.03.10 № 266

Реєстраційне посвідчення
№ UA/7756/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
АНАФЕРОН ДИТЯЧИЙ

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 таблетка містить антитіла до гамма-інтерферону людини афінно очищені: суміш гомеопатичних розведень C12, C30 та C50 – 3 мг;
допоміжні речовини: лактоза, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат.

Лікарська форма.

Таблетки.

Таблетки плоскоциліндричної форми, з рисою та фаскою, від білого до майже білого кольору. На одному плоскому боці з рисою нанесено напис MATERIA MEDICA, на іншому плоскому боці нанесено напис ANAFERON KID.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ “НВФ “Матеріа Медика Холдинг”, Російська Федерація.
Росія, 127473, м. Москва, 3-й Самотечний пров., буд. 9, тел./факс: +7 (495) 684-43-33.

Фармакотерапевтична група. Гомеопатичний препарат, що застосовується для профілактики та лікування ГРВІ та грипу. Код АТС L03A X15.

Коригуючи імунну систему, препарат чинить протівірусну дію та стимулює захисні сили організму. Препарат сприяє зменшенню прояву та тривалості основних симптомів ГРВІ та грипу (нежить, підвищена температура тіла, головний біль, кашель, біль у горлі, супутнє герпетичне ураження шкіри та слизових) у дітей, у тому числі тих, які часто хворіють, та дітей–вірусоносіїв; зменшує схильність до утворення гнійних фокусів (осередків), знижує ризик розвитку бактеріальних ускладнень; знижує концентрацію вірусу в уражених тканинах. Має антимуутагенні властивості.

Показання для застосування.

Профілактика та лікування (у складі комплексної терапії)

- гострих респіраторних вірусних інфекцій, грипу, герпетичних уражень шкіри та слизових оболонок;
- ускладнень ГРВІ, грипу;
- вторинних імунодефіцитних станів, які виникають внаслідок частих (рецидивних) захворювань ГРВІ, грипу, герпетичної інфекції.

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Особливі застереження.

Будь-які лікарські засоби дітям раннього віку застосовують під наглядом лікаря.

До складу препарату входить лактоза, у зв'язку з чим його не рекомендується призначати пацієнтам із природженою галактоземією, синдромом мальабсорбції глюкози або галактози та при вродженій лактазній недостатності.

Спосіб застосування та дози.

Застосування препарату рекомендовано дітям віком від **1 місяця**. Препарат приймають внутрішньо, по 1 таблетці, за 30 хв до або 30 хв після прийому їжі. Таблетку тримають у роті (бажано не розжовуючи та не ковтаючи) до повного розчинення. При призначенні препарату дітям молодшого віку (**1 місяць – 3 роки**) рекомендовано розчинити таблетку у невеликій кількості (1 столова ложка) кип'яченої води кімнатної температури.

Лікування потрібно починати як можна раніше при появі перших ознак гострої вірусної інфекції за такою схемою: перші 2 години препарат приймають кожні 30 хв, незалежно від прийому їжі; потім протягом першої доби – ще 3 таблетки через рівні проміжки часу. Починаючи з 2-ї доби й надалі препарат приймають по 1 таблетці 3 рази на добу до повного одужання. За необхідності, препарат можна поєднувати із симптоматичними засобами.

За відсутності покращання на третій день лікування препаратом необхідно звернутися за консультацією до лікаря.

Для профілактики приймають 1 раз на добу щоденно протягом 1 – 3 місяців (протягом усього епідемічного сезону).

Для лікування дітей старше 12 років призначають АНАФЕРОН.

Передозування.

При випадковому передозуванні можливі диспептичні прояви, спричинені компонентами, що входять до складу препарату.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції на компоненти препарату.

При застосуванні препарату у рекомендованих дозах побічної дії не виявлено.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Випадків несумісності з іншими лікарськими засобами не зареєстровано.

За необхідності, препарат можна застосовувати сумісно з іншими противірусними, антибактеріальними та симптоматичними засобами.

Термін придатності.

Термін придатності – 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в сухому місці при температурі не вище 25 °С, в оригінальній упаковці.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 20 таблеток у блістері, у картонній коробці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Дата останнього перегляду.